



## System BASF se umístil **na prvním místě** ve **výnosových pokusech** SPZO 2012/2013

Zdroj: Výsledky pokusů SPZO a ČZU Praha 2012/2013; 4 lokality v ČR  
Výnos t/ha, % navýšení oproti kontrole



## Doporučená aplikace přípravku Caryx® v řepce ozimé



**Dodržujte doporučenou dávku přípravku Caryx®**

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.  
Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.  
Tento materiál má pouze informativní charakter.

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 5, Česká republika  
tel.: +420 235 000 111, [www.agro.basf.cz](http://www.agro.basf.cz)

**BASF**  
The Chemical Company

# Co Vám pomůže dosáhnout vysokých výnosů řepky ozimé?

**BASF**  
The Chemical Company

# Caryx<sup>®</sup>

## Proč použít Caryx na jaře?


- Stimuluje větvení a napomáhá vývoji šesulí
- Srovnatelná účinnost proti fómové hnilobě
- Snižuje výšku a zabraňuje polehnutí porostu
- Účinnost již od 5 °C umožňuje flexibilní jarní ošetření



- Caryx pozitivně ovlivňuje architekturu rostliny
- Jarní aplikace Caryxu zvyšuje počet šesulí na rostlině až o 53 %
- Kombinace fungicidního a morforegulačního efektu přípravku Caryx vedou prokazatelně ke zvýšení výnosu o cca 15 %
- Praktické zkušenosti dokazují pozitivní vliv ošetření na rostlinu

## Výsledky pokusu zaměřeného na vliv aplikace růstového regulátoru na jaře na strukturu řepky

Zdroj: M. Roßberger; Quellendorf; 2013  
Jarní aplikace dne 16. 4. 2013,  
podzim: 1,0 l Caryx, květ: 0,5 l Pictor



## Účinnost na fómovou hnilobu při jarní aplikaci, hodnocení výskytu na rostlině



Fungicidní účinnost srovnatelná s hlavními používanými přípravky na trhu

Pokusy BASF v zemích CZ, FR, PL, DE v období 2005–2012

