

Errata:

- Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení
- Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

# Collis<sup>®</sup>



Jistota proti padlí révovému  
v každé situaci

 **BASF**  
The Chemical Company

# Collis<sup>®</sup>

## Popis přípravku



**Collis je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrá-  
tu k ošetření révy vinné proti padlí révovému (*Uncinula necator*)  
s vedlejším účinkem na botrytidu.**

Je to kombinovaný fungicid obsahující účinné látky boscalid a kresoxim-methyl. Obě látky se doplňují ve svých účincích proti patogenu, které spočívají v inhibici klíčení spór a potlačování růstu mycélia a tvorby spór. Nejlepších účinků se dosahuje při preventivním použití.

Účinná látka boscalid je přijímána rostlinou a systematicky ukládána do rostlinných pletiv. Účinná látka kresoxim-methyl tvoří depoty pevně vázané na voskovou vrstvu. Z těchto depotů je účinná látka dlouhodobě průběžně uvolňována a difúzními procesy rozdělována po povrchu rostliny.

Díky dvěma rozdílným mechanismům účinku proti patogenu a vlivem různých způsobů rozdělení účinných látek poskytuje Collis výbornou, dlouhodobou a bezpečnou ochranu rostliny.

### Výhody přípravku Collis

- spolehlivý účinek i při vysokém tlaku padlí
- dlouhé intervaly mezi postřiky - až 14 dní
- kombinace účinných látek, která je vhodná do antirezistentní strategie
- vedlejší účinek na botrytidu
- neškodný vůči užitečným organismům
- nemá vliv na kvašení a chuť hroznů
- vhodný do integrované ochrany rostlin



Vlevo révový keř, kde byl aplikovaný Collis, vpravo neošetřená kontrola silně napadená padlím

# Pokyny pro použití



Padlí révové na hroznů

Collis se může aplikovat ve fázi od kvetení až do uzavírání hroznů. Doporučujeme aplikovat Collis ve fázi od konce kvetení, což je období velmi citlivé na infekci padlím. Collis má zároveň vedlejší účinek na botrytidu.

V rámci antirezistentní strategie je možné provést max. 3 postřiky za sezónu a ne více než 2x po sobě bez přerušení ošetřením jinými fungicidy s odlišným mechanismem účinku.

## Doporučení k aplikaci

		Collis						
		0,3-0,6 l/ha						
Rašení	Před kvetením	Počátek kvetení	Konec kvetení	Po kvetení	Vývoj hroznů	Uzavírání hroznů	Zaměkání bobulí	

## Náš tip - na konci kvetení

### Forum Star 1,2 kg/ha + Collis 0,4 l/ha

Kompletní řešení proti peronospoře a padlí a silná primární ochrana proti botrytidě

- **dvojnásobná ochrana proti padlí révovému:** systémový účinek boscalidu a translaminární účinek kresoxim-methylu
- **trojnásobný účinek proti peronospoře:** hloubkový účinek dimethomorfu + kontaktní účinek folpetu + translaminární účinek kresoxim-methylu
- **trojnásobná ochrana proti botrytidě:** systémový boscalid + translaminární kresoxim-methyl + kontaktní folpet



# Collis<sup>®</sup>

## Jistota proti padlí révovému



### Profil produktu Collis

<b>Účinná látka</b>	boscalid 200g/l + kresoxim-methyl 100g/l
<b>Formulace</b>	suspenzní koncentrát (SC)
<b>Mechanismus účinku</b>	blokuje centrální látkovou výměnu a přenos energie v buňkách hub
<b>Působení</b>	padlí révové ( <i>Uncinula necator</i> )
<b>Vedlejší účinek</b>	botrytida ( <i>Botrytis cinerea</i> )
<b>Způsob účinku</b>	preventivní a kurativní
<b>Délka působení</b>	12–14 dní
<b>Dávkování</b>	0,3–0,6 l/ha
<b>Počet postřiků</b>	max. 3× za sezónu, max. 2× za sebou
<b>Ochranná lhůta</b>	28 dní
<b>Balení</b>	4 × 5l, HDPE kanystr
<b>Účinek na nečlivoé organismy</b>	nepoškozuje dravé roztoče, pro včely není nebezpečný

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.  
Tento materiál má pouze informativní charakter.