

FUNGICID

Registrační číslo: 4321-2

Charakteristika

Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentráту (EC) k ochraně ozimé a jarní pšenice proti padlí travnímu, rzi a braničnatce plevové, k ochraně jarního a ozimého ječmene před padlím travním, rzi, hnědou skvrnitostí ječmene a rynchosporiovou skvrnitostí

Složení

metkonazol 60 g/l



Použití v plodinách

ječmen jarní
ječmen ozimý
pšenice jarní
pšenice ozimá

Doporučené množství vody

200–600 l/ha

Ochranná lhůta

42 dnů

Mísitelnost

DAM 390	Listová hnojiva	Fungicidy	Růstové regulátory	Graminicity
ano (do dávky 50 l/ha)	ano	ano	ano	ano

Balení:

5l, PE/PA láhev



1. ZPŮSOB ÚČINKU

Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Padlí travní	<i>Blumeria graminis</i>
Rzi	<i>Puccinia spp.</i>
Hnědá skvrnitost ječmene	<i>Pyrenophora teres</i>
Rynchosporiová skvrnitost	<i>Rhynchosporium secalis</i>
Braničnatka plevová	<i>Parastagonospora nodorum</i>

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

4. REGISTROVANÁ APLIKACE

1) Plodina	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	3) Poznámka
Ječmen jarní, ječmen ozimý	padlí travní, rzi, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost	1,5 l/ha	42	od: 31 BBCH, do: 39 BBCH
Pšenice jarní, pšenice ozimá	padlí travní, rzi, braničnatka plevová	1,5 l/ha	42	od: 31 BBCH, do: 39 BBCH

5. DOPORUČENÍ K APLIKACI

Aplikační dávka vody: 200–600 l vody/ha.

Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného výskytu choroby.

Doporučujeme v kombinaci s přípravkem Curbatur EC 250 0,5 l/ha + Alterno 0,5 l/ha (Osiris Pack) od fáze BBCH 37 až do fáze BBCH 69.

6. OMEZENÍ

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50%	Tryska 75%	Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Jarní a ozimá pšenice	6	6	6	6

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.