

FUNGICID

Registrační číslo: 3530-0

Charakteristika

Systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentráту (EC) proti padlí trav-
nřmu a rzřm na pšenici, ječmeni a řitě

Složení

fenpropimorf 750 g/l

**Použitř v plodinách**

pšenice

ječmen

řito

Doporučené množství vody

100–400 l/ha

Ochranná lhůta

35 dnř

Mřitelnost

DAM 390	Listovř hnojiva	Insekticidy	Fungicidy	Rřstovř regulřtory	Herbicidy
ano (do dřvky 50 l DAM 390/ ha)	ano	ano	ano	ano	ano

Balenř:

5l, HDPE/PA kanystř



1. ZPŮSOB ÚČINKU

Corbel je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Má nejen rychlou počáteční, ale i dobrou reziduální účinnost (po dobu několika měsíců) proti padlí travnímu (*Erysiphe graminis*) na pšenici, žitu a ječmeni, proti rzi plevové (*Puccinia striiformis*) a rzi pšeničné (*Puccinia triticina*) na pšenici a žitu, rzi ječné (*P. hordei*) na ječmeni.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Padlí travní	<i>Erysiphe graminis</i>
Rez plevová	<i>Puccinia striiformis</i>
Rez pšeničná	<i>Puccinia triticina</i>
Rez ječná	<i>Puccinia hordei</i>

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

4. REGISTRovaná APLIKACE

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka na ha	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice, ječmen, žito	padlí travní, rzi	1 l	35	

5. DOPORUČENÍ K APLIKACI

Maximální počet aplikací na plodinu za vegetaci: 2x

Interval mezi aplikacemi: 21 dní

Aplikační dávka vody: 100 - 400 l/ha

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

6. OMEZENÍ

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu nečlověkových organismů:

Plodina	Bez redukce	Tryska 50%	Tryska 75%	Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Pšenice, ječmen, žito	35	18	9	4

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku výhradně ze skupiny aminů (např.: fenpropimorf, fenpropidin, spiroxamin) po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu aminu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek