



Divexo®

Fungicid

Divexo®

Registrační číslo: 6120-0

Charakteristika

Fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ošetření brambor, cibule a česneku.

Složení

ametoktradin 120 g/l (11,21 % hmot.)

propamokarb-hydrochlorid 451 g/l (46,98 % hmot.)

Použití v plodinách:

brambor

cibule

česnek

Doporučené množství vody

brambor 200–400 l/ha

cibule, česnek 200–1000 l/ha

Ochranná lhůta:

7 dní

Balení:

4× 5 l kanistr

1. ZPŮSOB ÚČINKU:

Propamocarb je systemicky působící karbamát, který účinkuje na buněčné úrovni na růst mycelia, produkci a klíčení spór. Látka potlačuje choroby způsobené oomycetami v půdě na kořenech a listech. Přípravek obsahuje účinnou látku ametoktradin, která silně inhibuje vývoj zoospor a infekci hostitelských rostlin zoosporami a zoosporangii.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI:

Plíseň bramboru - *Phytophthora infestans*

Plíseň cibulová - *Peronospora destructor*

3. REGISTROVANÁ APLIKACE:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
brambor	plíseň bramboru	2 l/ha	7	1) od 21 BBCH, do 89 BBCH	5) pole
cibule, česnek	plíseň cibulová	2 l/ha	7	1) od 14 BBCH, do 49 BBCH	5) pole



4. DOPORUČENÍ K APLIKACI:

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	200–400 l/ha	postřik	2× za rok	5–10 dnů
cibule, česnek	200–1000 l/ha	postřik	1×	

5. OMEZENÍ:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QOSI (AMETOKTRADIN), po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Podina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50%	75%	90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
brambor, cibule, česnek	4	4	4	4

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu lidského zdraví

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50%	75%	90%
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
brambor, cibule, česnek	3	3	3	3

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Další upřesnění naleznete na etiketě.