



Enervin® Pro

Registrační číslo: 5877-0

Charakteristika

Fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ošetření révy vinné, brambor, okurky, cukety, rajčete a baklažánu.

Složení

ametoktradin 75 g/l (5,76 % hmot.)

fosfonáty draselné 453 g/l (34,8 % hmot.)

Použití v plodinách

réva	okurka	rajče
brambor	cuketa	baklažán

Doporučené množství vody

brambor 200–500 l/ha

okurka, cuketa, rajče, baklažán 100–1500 l/ha

Ochranná lhůta

podle plodiny (viz 3. REGISTRovaná APLIKACE)

Balení

2 × 10 l kanystr

1. ZPŮSOB ÚČINKU:

Fosfonáty draselné působí systemicky, a to primárně přímou inhibicí patogena, tj. zpomalením jeho růstu, omezením tvorby a uvolňování spor. Nepřímo inhibují patogena stimulací obrany hostitele. Přípravek obsahuje účinnou látku ametoktradin, která silně inhibuje vývoj zoospor a infekci hostitelských rostlin zoosporami a zoosporangii.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI:

Plíseň révy - *Plasmopara viticola*

Plíseň bramborová - *Phytophthora infestans*

Píseň okurky - *Pseudoperonospora cubensis*



3. REGISTRovaná APLIKACE:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	plíseň révy	max. 4,2 l/ha	35	1) od: 70 BBCH, do: 83 BBCH	4) 3,2 L/10 000 m ² LWA 5) venkovní prostory
brambor	plíseň bramborová	3,2 l/ha	7	1) od: 21 BBCH, do: 89 BBCH	5) pole
okurka, cuketa	plíseň okurky	3,2 l/ha	1	1) od: 29 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky
rajče, baklažán	plíseň bramboru	3,2 l/ha	1	1) od: 21 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky

4. DOPORUČENÍ K APLIKACI:

Dávku lze možné vypočíst podle LWA výpočtu.

$LWA = (\text{ošetřená výška keře} \times 2 \times 10\,000) / \text{šířka meziřadí}$

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby, max. počet aplikací v plodině je 2x za rok. Doporučený interval mezi aplikacemi viz etiketa přípravku.

5. OMEZENÍ:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek v révě proti plísni révy tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QOSI (AMETOKTRADIN) vícekrát než 3x za vegetační sezonu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
réva	10	6	6	6
brambor	4	4	4	4

Réva:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Další upřesnění naleznete na etiketě.