

HiStick[®] Soy



Registrační číslo: 1156

Charakteristika

HiStick Soy je očkovací látka hlízkových bakterií *Bradyrhizobium* na bázi rašeliny. Zvyšuje výnosy plodin a obsah bílkovin, oleje a dalších nutričních látek. Jeho použití omezuje dávky dusíkatých hnojiv a zvyšuje vyrovnanost porostů

Složení

min. 2x 10⁹ g *Bradyrhizobium japonicum* sp.

Použití v plodinách

sója

Doporučené množství vody

800 ml/ balíček v případě kalové inokulace

Balení

20x 400 g, hermeticky uzavřený PE sáček

1. ZPŮSOB ÚČINKU

HiStick Soy je určen pro inokulaci sóji. Po otevření balíčku jemně zmáčkněte a vyprázdněte obsah pro jednu z následujících zvolených metod inokulace.

Kalová inokulace

Obsah přidejte do 800ml vody a dobře promíchejte v čisté nádobě. Směs inokulantu vylijte na osivo a pořádně zamíchejte tak, aby osivo bylo s jistotou obaleno rovnoměrně. Před umístěním do násypky secího stroje nechte osivo oschnout.

Vlhká inokulace

Dejte dost vody, aby osivo bylo poněkud navlhlčené (2 ml na kg osiva). Promíchejte vlhké osivo s inokulantem tak, aby bylo rovnoměrně obaleno.

Suchá inokulace

Potřebnou část inokulantu sypte na tenké vrstvy osiva do násypky secího stroje a promíchejte rukou. HiStick Soy inokulant je kompatibilní se suchými přípravky na bázi carbathiinu, metalaxylu, captanu, thiramu, thiabendazolu, streptomycinu a Vitavaxu M. Jedno balení, tj. 400g přípravku HiStick Soy je určeno pro inokulaci výsevku na 1 ha, tj. u sóji 100–125 kg osiva.

Upozornění: HiStick Soy musí být použit nejdéle do 24 hodin před setím. Při aplikaci je nutné přípravek i inokulované osivo uchránit před přímým slunečním zářením. V případě aplikace přípravku na mořené osivo je třeba dodržovat bezpečností

2. NÁSLEDNÉ PLODINY

Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

3. REGISTRovaná APLIKACE

Plodina	Dávka na ha	Poznámky
Sója	400 g	100–125 kg osiva

4. DOPORUČENÍ K APLIKACI

400 g/ha (100–125 kg osiva)

5. OMEZENÍ

Nejsou známa.