

MOŘIDLO

Registrační číslo: 5832-0

Charakteristika

Kapalný fungicidní suspenzní koncentrát (FS) pro moření osiva pšenice ozimé proti sněti zakrslé a sněti mazlavé pšeničné

Složení

mefentriflukonazol 50 g/l (4,72 % hmot.)



Použití v plodinách

pšenice ozimá, včetně
pšenice tvrdé, pšenice špaldy, pšenice jednozrnky a pšenice dvouzrnky

Dávkování mořidla

0,1 l/100 kg osiva

Ochranná lhůta

AT

Mísitelnost

Přípravek Relenya je kompatibilní s běžně používanými mořidly výrobce BASF. Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Balení:

4 x 5 l f-HDPE kanystr



1. ZPŮSOB ÚČINKU

Relenya je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoliv adhezivních látek. Používají se mořicí zařízení pro moření mokrou cestou. Účinná látka mefentriflukonazol patří do chemické skupiny triazolů, blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI).

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Sněť zakrslá	<i>Tilletia controversa</i>
Sněť mazlavá pšeničná	<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia tritici</i>

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

4. REGISTROVANÁ APLIKACE

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka	OL	Poznámky
Pšenice ozimá	sněť zakrslá sněť mazlavá pšeničná	1 l / t osiva	AT	moření osiva

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace
Pšenice ozimá	0–0,7 l/100 kg osiva	moření

5. DOPORUČENÍ K APLIKACI

Přípravek lze aplikovat jen profesionálním zařízením pro aplikaci přípravků určených pro moření osiv, které je vybaveno dostatečným odsáváním aerosolu / prachu vznikajícím při moření osiva. Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu. Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

6. OMEZENÍ

Je zakázáno zkrmovat namořené osivo hospodářským zvířatům a rybám!
Pytle s namořeným osivem musí být zřetelně označeny "Pozor - osivo mořené přípravkem Relenya, který obsahuje mefentriflukonazol. Prázdné pytle nesmí být znovu použity. Ošetřené osivo lze likvidovat pouze vysetím!

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.