

FUNGICID

Registrační číslo: 4668-0

Charakteristika

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti padlí révovému (*Uncinula necator*) na révě vinné

Složení

metrafenon 500 g/l



Použití v plodinách

réva vinná

Doporučené množství vody

300–1000 l/ha

Ochranná lhůta

28 dní

Mísitelnost

Je mísitelný s běžnými fungicidy a akaricidy.

Balení:

10 x 1 l, HDPE láhev



1. ZPŮSOB ÚČINKU

Vivando je fungicidní přípravek proti padlí révovému obsahující metrafenon. Metrafenon je účinná látka z nové skupiny benzofofenonů. Mechanismus působení se liší od všech doposud zaregistrovaných fungicidů proti padlí. Metrafenon zabraňuje vniknutí houby do rostlinných pletiv, kromě toho brzdí i růst mycelií, tvorbu haustorií a sporulaci padlí. Nejlepší účinnosti je dosahováno při preventivním ošetření. Účinná látka je rychle přijata rostlinnými pletivy a má lokálně-systemické působení, na povrchu listů je rozváděna v plynné fázi, tím jsou chráněna i přirůstající pletiva.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Padlí révové	<i>Uncinula necator</i>
--------------	-------------------------

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

4. REGISTRovaná APLIKACE

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka na ha	Ochranná lhůta (dny)	Poznámky
Réva vinná	padlí révové	0,16 l/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody/ha (min. koncentrace 0,032 %) 0,32 l/ha od BBCH 61 (počátek kvetení) max. 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,032 %)	28	max. 2x v průběhu vegetace

5. DOPORUČENÍ K APLIKACI

0,16–0,32 l Vivando na hektar (0,032 %)
max. 2x za sezónu

První ošetření se provádí nejlépe preventivně, nejdříve však od fáze 5 listů révy (15 dle BBCH). Další ošetření následují v 10–14 denních intervalech. Při vysokém infekčním tlaku (v období silných srážek) a rychlém nárůstu nových listů je třeba tento interval zkrátit. Provádějte nejvýše 2 ošetření za vegetační sezónu. V systému ošetření by neměla následovat více než dvě ošetření přípravkem Vivando bezprostředně po sobě, po nich je vhodné přerušit sled ošetření přípravkem obsahujícím účinnou látku z jiné skupiny.

6. OMEZENÍ

Nejsou známa žádná omezení.

7. PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Před použitím přípravků důkladně protřepejte. Odměřené množství vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem.

Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujte dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujte.

8. UPOZORNĚNÍ

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Vivando®