

Limus® Perform 2.0

Inhibitor ureázy pro kapalná minerální hnojiva obsahující močovinu

Látky a směsi z původního materiálu: 2,2'-oxydiethanol CAS číslo: 111-46-6, N-butylthiofosforečnantriamid (NBPT) CAS číslo: 94317-64-3, 1-(2-hydroxyethyl)pyrrolidin-2-one CAS číslo: 3445-11-2, 1-(N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino)propane-2-ol CAS číslo: 6712-98-7, N-propylthiofosforečnantriamidu (NPPT) CAS číslo: 916809-14-8

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

P101 I Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

P201 Před použitím si obzortejte speciální instrukce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Varování

číslo šarže:

datum výroby:

datum expirace:

Limus[®] Perform 2.0

KFV 5(C) kategorie: Inhibitor ureázy pro kapalná minerální hnojiva obsahující močovinu

Návod k použití: Když jsou kapalná hnojiva uváděna na trh, může k nim být přidán Inhibitor ureázy (IU) „směs N-butylthiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-propylthiofosforečnantriamidu (NPPT) (v poměru 3:1), pokud alespoň 50 % celkového obsahu dusíku v hnojivu tvoří dusík ve formě močovinového dusíku*. Zemědělec může IU použít s hnojivy obsahujícími různé množství močovinového dusíku.

Pro zajištění maximální účinnosti inhibitoru ureázy je doporučováno následující dávkování:

	Dávka (L/1000L DAM)
DAM28	0.9
DAM30	1.0
DAM32	1.1

Pro konkrétní informace o kompatibilitě tankmixu s dalšími hnojivy nebo přípravky na ochranu rostlin prosím kontaktujte svého distributora. Tankmix spotřebujte do 14 dnů. Pro aplikaci kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu, jako je dusičnan amonný s močovinou, by měla být dodržena dobrá zemědělská praxe (trysky, aplikační hadice).

Skladovací podmínky: Skladujte uzamčené. Neskladujte při teplotě nad 25 °C. Skladování při vyšších teplotách může zkrátit dobu použitelnosti. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv pro zvířata. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zajistěte důkladné větrání skladovacích a pracovních prostor. Použijte před datem expirace uvedeným na obalu.

Ochrana proti ohni a výbuchu: Výpary mohou se vzduchem vytvořit vznětlivou směs. Zamezte vzniku elektrostatického náboje – zápalné zdroje musí být drženy v dostatečné vzdálenosti – hasicí přístroje musí být připraveny v pohotovosti.

Informace o bezpečnosti a životním prostředí: Před použitím si přečtěte údaje na štítku a řiďte se jimi. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Před použitím si obstarajte speciální instrukce. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte kontaminované části těla. Způsobuje vážné poškození očí. Nevdechujte páry/aerosoly. Zdraví škodlivý při požití. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Používejte osobní ochranný oděv. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nevypouštějte do podloží/půdy. Nevypouštějte do odpadů / povrchových vod / podzemních vod. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Všeobecné informace: Produkt je klasifikován podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 a systému GHS.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

* Minimální a maximální obsah IU je 0,0176 % a 0,2088 % hmotnostně z celkového množství dusíku přítomného ve formě močovinového dusíku.

Obsah IU v přípravku Limus[®] Perform 2.0 je 25 % (hmotnostní procento)

