

HiStick[®] Soy

pomocný rostlinný přípravek

Žadatel: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8

Výrobce: BASF Agricultural Specialities Limited, Earl Road, Cheadle Hulme, Cheshire, Velká Británie

Číslo rozhodnutí o registraci: **1156**

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Vlastnost:	hodnota:
Vlhkost v % min.	50,0
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min.	30,0
Hodnota pH	7,0 až 8,0
Obsah živých buněk Bradyrhizobium japonicum sp. v 1 gramu min.	2×10^9

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity mg/kg přípravku: kadmium 1; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50.

HiStick[®] Soy je očkovací látka hlízkových bakterií Bradyrhizobium na bázi rašeliny. Zvyšuje výnosy plodin a obsah bílkovin, oleje a dalších nutričních látek. Jeho použití omezuje dávky dusíkatých hnojiv, zvyšuje vyrovnanost porostů a snižuje konkurenční tlak plevelů.

Rozsah a způsob použití:

HiStick[®] Soy je určen pro inokulaci sóji. Po otevření balíčku jemně zmáčkněte a vyprázdněte obsah pro jednu z následujících zvolených metod inokulace.

Kalová inokulace. Obsah přidejte do 800 ml vody a dobře promíchejte v čisté nádobě. Směs inokulantu vylijte na osivo a pořádně zamíchejte tak, aby osivo bylo s jistotou obaleno rovnoměrně. Před umístěním do násypky secího stroje nechte osivo oschnout.

Vlhká inokulace. Dejte dost vody, aby osivo bylo poněkud navlhčené (2 ml na kg osiva). Promíchejte vlhké osivo s inokulantem tak, aby bylo rovnoměrně obaleno.

Suchá inokulace. Potřebnou část inokulantu sypte na tenké vrstvy osiva do násypky secího stroje a promíchejte rukou.

HiStick[®] Soy inokulant je kompatibilní se suchými přípravky na bázi carbathiinu, metalaxyly, captanu, thiramu, thiabendazolu, streptomycinu a Vitavaxu M.

Jedno balení tj. 400 g přípravku HiStick[®] Soy je určeno pro inokulaci výsevu na 1 ha tj. u sóji 100-125 kg osiva. Upozornění: HiStick[®] Soy musí být použit nejdéle do 24 hodin před setím. Při aplikaci je nutné přípravek i inokulované osivo uchránit před přímým slunečním zářením.

V případě aplikace přípravku na mořené osivo je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s mořeným osivem.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

Při nadýchání: vyved'te postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží: zasažené místo ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte

Při zasažení očí: oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při požití: ústa vypláchněte vodou a dejte vypít asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku. Nevyvolávejte zvracení.

Podmínky skladování:

HiStick® Soy se skladuje při teplotě pod 25 °C mimo přímý sluneční svit. Teplota nesmí přesáhnout 30 °C. Inokulované osivo se skladuje na chladném a zastíněném místě a pokud možno se vysévá co nejdříve po aplikaci přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Velikost balení: 400 g, hermeticky uzavřeno

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

® registrovaná známka BASF

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

BASF spol. s r.o.