

Vaztak[®] Active

Osvědčený insekticid s novou formulací
pro odpovědnou ochranu lesa

Výhody na první pohled

- Dlouhá kontaktní i požerová účinnost
- Vysoká odolnost proti dešti (po zaschnutí)
- Snadná mísitelnost nové formulace bez rozpouštědel
- Vynikající na obranné pasti
- Zvláště účinný při nízkých teplotách

BASF Professional & Specialty Solutions



Vaztak® Active je osvědčený insekticid na likvidaci listožravého a dřevokazného hmyzu, klikoroha borového, tesaříků, krasců a dalších škodlivých druhů

Způsob účinku

Vaztak® Active působí jako kontaktní a požerový insekticid. Po proniknutí do organismu narušuje nervový systém brouků. Je tak okamžitou a zároveň dlouhodobou ochranou.


Výhody nové formulace

Nová formulace zabezpečuje vynikající pokrývnost (nižší spotřebu postřiku), rychlejší zasychání a vynikající adhezi na povrchu. Nová formulace neobsahuje rozpouštědla ani formaldehyd, takže je šetrnější k životnímu prostředí.


Profil produktu

Indikace	lýkožrout, klikoroh, tesařík, krascovití
Účinná látka	alfa-cypermethrin (50 g/l)
Formulace	ME (mikroemulze)
Balení	1 l láhev, 5 l kanystr
Způsob účinku	Narušení nervového systému při požití a kontaktu. Způsobuje přebuzení nervové soustavy hmyzu a následně jeho smrt.
Délka účinnosti	až 24 týdnů

Špatná smáčivost běžné formulace



Vynikající smáčivost nové formulace



Tvar a smáčivost kapek zrychluje zasychání postřiku a zároveň zlepšuje pokrytí povrchu.

Způsob použití

Plodina	Škodlivý činitel	Dávka	OL	LA	Poznámka
Smrk	lýkožrout smrkový a ostatní kůrovci na smrku	1 %	AT	-	max. 1×, asanace a příprava lapáků
		0,6 %	AT	-	max. 1×, prevence
Jehličnany	dřevokaz čárkovaný	2 %	AT	-	max. 1×, prevence
	dřevokaz čárkovaný	4 %	AT	-	max. 1×, asanace
	klikoroh borový	1 %	AT	-	max. 1×, máčení
Borovice, modřín, listnáče okrasné	kůrovci	0,6 %	AT	-	max. 1×, preventivně
		1 %	AT	-	max. 1×, asanace a příprava lapáků

Preventivní postřik na skládkách proti lýkožroutu smrkovému, proti ostatním kůrovcům a proti dřevokazu čárkovanému se provádí zpravidla zádožným postřikovačem. Preventivní máčení zelených částí sazenic jehličnanů se provádí proti klikorohu borovému - spotřeba aplikační kapaliny - 20 l/1000 sazenic.

BASF
We create chemistry

Tento materiál má pouze informační charakter. Používejte přípravky na ochranu rostlin vždy bezpečně. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Před použitím si vždy důkladně přečtěte informace na etiketě a informace o výrobku.

BASF spol. s r. o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
tel. +420 737 240 550

Všechny produkty a loga opatřená symbolem ® jsou registrovanými obchodními názvy a značkami společnosti BASF.

© BASF. Všechna práva vyhrazena