

Přípravky pro ochranu zeleniny

Fungicidy

Cantus®

Collis®

Dagonis®

Divexo® Novinka

Enervin® Pro Novinka

Kumulus® WG

Scala®

Serifel® Bio

Signum®

Herbicidy

Butisan® 400 SC

Stomp® 400 SC

Stomp® Aqua

Stratos® Ultra



Přípravek na ochranu rostlin k ošetření brambor, cibule a česneku

Divexo® obsahuje účinnou látku ametoktradin - Initium®, která silně inhibuje vývoj zoospor a infekci hostitelských rostlin zoosporami a zoosporangii. Propamocarb je systemicky působící karbamát, který účinkuje na buněčné úrovni na růst mycelia, produkci a klíčení spor. Látka potlačuje choroby způsobené oomycetami v půdě na kořenech a listech.

Přidaná nová výhoda!

- výborná účinnost
- synergický účinek látek
- nástroj řízení rezistence
- unikátní způsob účinku

Divexo®	
Spektrum účinku	cibule, česnek - plíseň cibulová
Aplikační dávka	2 l/ha
Dávka vody	200–1 000 l/ha
Termín aplikace	od 14 BBCH do 49 BBCH
Poznámky k aplikaci	Maximální počet aplikací: 1 za rok Ochranná lhůta: 7 dní

Přípravek na ochranu rostlin k ošetření révy vinné, brambor, okurky, cukety, rajčete a baklažánu

Přípravek obsahuje účinnou látku ametoktradin - Initium®, a fosfonáty draselné, které působí systemicky, a to primárně přímou inhibicí patogena, tj. zpomalením jeho růstu, omezením tvorby a uvolňování spor. Nepřímo inhibují patogena stimulací obrany hostitele.

Enervin® Pro	
Spektrum účinku	Okurka, cuketa - plíseň okurky Rajče, baklažán - plíseň bramboru Pór - zasychání špiček listů póru; Cibule jarní - plíseň; salát, špenát a další - plíseň
Rozšíření prosinec 2025: Venkovní prostory	
Aplikační dávka	3,2 l/ha
Dávka vody	100–1 500 l/ha
Termín aplikace	Okurka, cuketa - BBCH 29–89 Rajče, baklažán - BBCH 21–89
Poznámky k aplikaci	Maximální počet aplikací: 2x za rok Ochranná lhůta: 1 den Interval mezi aplikacemi: 7–10 dnů Použití ve sklenících

Více informací naleznete na etiketě a u obchodního zástupce
Ing. Drahomíry Musilové, tel.: 737 240 534.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Tento materiál má pouze informativní charakter.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.



Přípravek obsahuje účinnou látku pyrimethanil. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2–3 dní i kurativně. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C. Přípravek je povolen do **cibule** na botryotiniovou skvrnitost listů cibule, do **póru** na alternáriovou skvrnitost česnekovitých, do **mrkve** na suchou skvrnitost listů mrkve. Dále do **okurky, cukety, patizonu a tykve** na plíseň šedou. Také je registrován v révě a ovoci.

Serifel® je biologický fungicid obsahující účinnou látku *Bacillus amyloliquefaciens*. Serifel® je moderním a udržitelným řešením pro zemědělce, spotřebitele i životní prostředí. Přípravek je povolen do **rajčete, papriky, salátu, ale i v zelenině listové, tykvoité, kořenové a košťálové**. Registraci přípravku Serifel® se podařilo rozšířit o **zeleninu košťálovou, květák, brokolici, zelí pekingské, kapustu kadeřavou a kedluben** s účinností proti padlí a alternáriové skvrnitosti. Dále pak u veškeré **kořenové zeleniny** (mimo mrkev) o padlí mířkovitých. U **řepy salátové a celeru** je registrace i proti alternáriové skvrnitosti a plísni šedé. Přípravek lze použít také v **cibuli a póru** proti alternáriové skvrnitosti česnekovitých.

BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz

BASF
We create chemistry