

Ochrana chmele s přípravky BASF

Kumulus® WG, Bellis®, Serifel® a Vivando®

Vážení pěstitelé chmele, je nám velkou ctí být vaším partnerem v ochraně chmele. Společnost BASF měla a stále má v portfoliu přípravků do chmele vám dobře známý **Kumulus® WG**. Dále přípravek **Bellis®** proti plísni chmelové a padlí chmelovému, který si získal velkou oblibu. Přípravek **Serifel®** proti plísni šedé a padlí chmele. Dále nabízíme přípravek **Vivando®** proti padlí chmele.



Bellis®

- výborné výsledky proti peronospoře a padlí
- dle interních pokusů velmi dobře působí i proti *Botrytis*
- odolnost proti smyvu deštěm

Serifel®

- koncentrovaný biologický fungicid
- flexibilní řešení
- bezpečný pro uživatele, ŽP a spotřebitele
- preventivní použití od 15 °C a při vysoké vlhkosti

Vivando®

- lokálně-systemické působení
- dlouhodobý preventivní účinek
- dvojitá ochrana rostoucí tkáně
- odolnost proti smyvu deštěm

Bellis®

Charakteristika přípravku

Obsah účinných látek	252 g/kg boscalid + 128 g/kg pyraclostrobin
Formulace	ve vodě rozpustné granule (WG)
Škodlivý organismus	padlí chmelové - <i>Sphaerotheca humuli</i> , plíseň chmelová - <i>Pseudoperonospora humuli</i> , sekundární infekce
Aplikační dávka přípravku a termín použití	0,9–2,0 kg/ha (do BBCH 37 - 0,9 kg/ha; BBCH 37–55 - 1,4 kg/ha; od BBCH 55 - 2,0 kg/ha)
Aplikační dávka vody	700–1 000 l/ha při výšce chmele do 1/2 konstrukce, 1 000–1 500 l/ha při výšce chmele do 3/4 konstrukce, 1 500–2 000 l/ha při plném vzrůstu
Interval mezi aplikacemi, počet aplikací a ochranná lhůta	8–14 dnů max. 3x za rok/sezónu OL 28 dnů
Balení	2 × 5 kg v jednom kartonu

Serifel®

Charakteristika přípravku

Obsah účinných látek	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> kmen MBI 600
Formulace	smáčitelný prášek (WP)
Škodlivý organismus	plíseň šedá padlí chmelové
Aplikační dávka přípravku a termín použití	0,5 kg/ha BBCH 21–BBCH 89
Aplikační dávka vody	150–1 000 l/ha
Interval mezi aplikacemi, počet aplikací a ochranná lhůta	7 dnů max. 10x za rok v intervalu 7 dnů OL 1 den
Balení	10 × 0,5 kg

Kumulus® WG

Charakteristika přípravku

Obsah účinných látek	800 g/kg síra
Formulace	ve vodě rozpustné granule (WG)
Škodlivý organismus	padlí chmelové <i>Sphaerotheca humuli</i> , vedlejší akaricidní účinek
Aplikační dávka přípravku a termín použití	10–12,5 kg/ha BBCH 11–BBCH 87
Aplikační dávka vody	1 000 l/ha
Interval mezi aplikacemi, počet aplikací a ochranná lhůta	5–10 dnů max. 6x za rok/sezónu OL 7 dnů
Balení	1 × 20 kg

Vivando®

Charakteristika přípravku

Obsah účinných látek	metrafenon 500 g/l
Formulace	suspenzní koncentrát (SC)
Škodlivý organismus	padlí chmelové <i>Sphaerotheca humuli</i>
Aplikační dávka přípravku a termín použití	0,3–0,66 l/ha BBCH 32–BBCH 81
Aplikační dávka vody	800–3 300 l/ha
Interval mezi aplikacemi, počet aplikací a ochranná lhůta	7–12 dnů max. 2x za rok/sezónu OL 3 dny
Balení	10 × 1 l

BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz

® = registrovaná ochranná známka společnosti BASF SE

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace
o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Více informací u obchodního zástupce: Ing. Drahomíra Musilovou
mobil: +420 737 240 534, e-mail: drahomira.musilova@basf.com

 **BASF**
We create chemistry