BASF
We create chemistry

Belanty®

Rozdíl, který oceníte

Belanty® řeší alternáriovou skvrnitost bramboru

Symptomy alternáriové skvrnitosti jsou viditelné zejména na starších listech, kde se vyskytují nejprve žluté a později hnědnoucí suché skvrny různých tvarů. Při silné infekci může dojít k tomu, že listy zcela odumřou. Příznaky se nejčastěji objevují v průběhu června. Podobné příznaky se vyskytují na slupce hlíz, pokud dojde k jejich napadení. Důsledkem napadení může být výrazné snížení výnosu. Mezi příznivé faktory vzniku napadení brambor touto chorobou patří náchylnost odrůdy k napadení, střídavé podmínky, vysoké teploty nebo nižší vlhkost.

Představujeme Revysol®

Belanty® obsahuje účinnou látku Revysol®. Nový, moderní fungicid - azol Revysol® - splňuje nejpřísnější kritéria nejen z hlediska účinnosti, ale také z pohledu toxikologického, s ohledem na životní prostředí a bezpečnost pro člověka. Není mutagenní ani toxický a nenarušuje činnost endokrinních žláz. Revysol® je mimořádně flexibilní, rychle proniká do pletiv a dlouhodobě chrání rostlinná pletiva.

Fungicid Belanty® vykazuje na alternáriovou skvrnitost vysokou účinnost. Zajišťuje tak navýšení výnosu a celkové vylepšení ekonomiky pěstování. V mnoha pokusech se ukázalo, že Belanty® s obsahem Revysolu® dosahuje vyšší účinnosti než konkurenční přípravky.

- **Účinnost proti alternáriové skvrnitosti**
- **Rychlý příjem listy a dlouhodobé působení**
- **Flexibilní použití, odolnost proti smyvu**

Profil přípravku

Druh přípravku	Fungicid
Účinná látka	Mefentriflukonazol (Revysol®) 75 g/l
Formulace	Suspenzní koncentrát (SC+)
Registrace	**Brambory** (přípravek je dále registrovaný do cukrové řepy, kukuřice, řepky olejky, jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, meruňky a révy)
Spektrum účinku	Alternáriová skvrnitost
Doporučená dávka	**1,25 l/ha**
Dávka vody	100–400 l/ha

Belanty®

Dlouhodobá účinnost proti alternáriové skvrnitosti

Hodnocení účinnosti 7. 9. 2021

Pokusy EU 2021, odrůda Kuras



Napadení neošetřené kontroly bylo 97,5 %.
U Belanty® byla zjištěna vynikající účinnost proti alternáriové skvrnitosti. Zároveň byl zjištěn vysoký výnos - aplikace Belanty® se vyplatí.

Hodnocení účinnosti 7 dní po poslední aplikaci

Odrůda Kuras, Slovensko 2021



Napadení neošetřené kontroly bylo 73 %.
Bylo prokázáno, že fungicid Belanty® vyniká nadstandardními výsledky.

Doporučení k aplikaci

- Aplikace sólo nebo v kombinaci s ostatními fungicidy proti plísni bramborové, např. Belanty® + Samiron® 1,25 + 2,5 l/ha.
- Maximální počet aplikací za vegetaci - 3.
- Interval mezi ošetřeními 7–14 dní v závislosti na síle infekčního tlaku.

Belanty®
1,25 l/ha



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Tento materiál má pouze informativní charakter.

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 235 000 111

www.agro.basf.cz

BASF
We create chemistry