



We create chemistry

Řešení BASF pro ochranu brambor

Fungicidy

Enervin® Pro **Novinka**

Divexo® **Novinka**

Sercadis®

Belanty®

Herbicid

Basagran®

Stratos® Ultra

Insekticid

Kachikoma®



Enervin® Pro

Pust'te se do toho!

Zdravý start pro úrodu brambor

Novinka 2026



- Obsahuje kombinaci jedinečných účinných látek
- Ochrání nové přírůstky
- Antirezistentní strategie
- Odolnost vůči dešti

Dvě jedinečné účinné látky pro ochranu celé rostliny

Účinná látka 1

75 g/l ametoktradin
(obchodní název Initium®)



Pro preventivní kontaktní působení

Po aplikaci vytváří stabilní ochranný film na povrchu listů, odkud se postupně uvolňuje a blokuje klíčení spor, čímž zabraňuje počátečnímu rozvoji infekce.

Účinná látka 2

453 g/l fosfonáty draselné (KHP)



Pro rychlou absorpci a mobilitu

Po proniknutí do rostliny aktivují její přirozené obranné mechanismy a zajišťují vnitřní ochranu rostliny i nově rostoucích částí.

Formulace

Suspenzní koncentrát SC

Optimalizovaný
poměr Initium® /
fosfonáty draselné

1:4


pro silnou preventivní
ochranu a pokrytí
listů

Zvýšená kvalita & výnos díky Enervin® Pro


- Kombinuje dvě jedinečné účinné látky do jednoho optimalizovaného přípravku chránícího celou rostlinu s kontaktním a systémovým účinkem
- Velmi selektivní a bez problému mísitelný, působí za všech povětrnostních podmínek a je základním nástrojem pro minimalizaci rizika vzniku rezistence vůči plísni bramborové
- Zdravější rostliny chráněné přípravkem Enervin® Pro poskytují vyšší výnosy

Příjem a plně systémová translokace KHP

Vstřebávání do voskové vrstvy a lokální přítomnost účinné látky Initium = ochrana celé rostliny.



Enervin® Pro - absorpce a profil mobility



	Kontaktní aktivita	Kutikulární absorpce	Povrch redistribuce	Translaminární pohyb	Apikální mobilita	Bazipetální mobilita
Initium®	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓		✓✓	
KHP	✓			✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓


Enervin® Pro v bramborách

Účinná látka	Ametoktradin 75 g/l (Initium®), Fosfonáty draselné 453 g/l
Formulace	Suspenzní koncentrát (SC)
Choroba	Plíseň bramborová
Aplikační dávka	3,2 l/ha
Dávka vody	200–500 l/ha
Termín aplikace	Od 21 BBCH do 89 BBCH
Poznámky k aplikaci	Maximální počet aplikací: 2x za rok Ochranná lhůta: 7 dní Interval mezi aplikacemi: 5–10 dní
Přípravek je dále registrován do okurky, cukety, rajčete, baklažánu a révy.	

Spolehlivá účinnost Enervin® Pro

Aditivní efekt - obě účinné látky Initium®, jako silný komponent a KHP přispívají ke spolehlivé účinnosti přípravku.

Účinnost proti plísni bramborové v %, pokusy EU, n = 11, napadení neošetřené kontroly bylo 94 %



Divexo®


Lepší ochrana s přidanou hodnotou

Novinka 2026




- Spolehlivá účinnost na plíseň bramborovou během vegetace
- Synergický účinek obsažených látek
- Antirezistentní řešení

Divexo® obsahuje účinnou látku ametoktradin - Initium®, která silně inhibuje vývoj zoospor a infekci hostitelských rostlin zoosporami a zoosporangii. Propamocarb je systemicky působící karbamát, který účinkuje na buněčné úrovni na růst mycelia, produkci a klíčení spor. Látka potlačuje choroby způsobené oomycetami v půdě, na kořenech a listech.




Napadení natě plísní bramboru

Napadení v %, odrůda Ditta (poloraná konzumní odrůda),
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Valečov, 2024



Divexo® - optimální kombinace pro výbornou účinnost



Propamocarb

- Silný preventivní účinek obou účinných látek - tvorba a uvolňování zoospor, mobilita a klíčení spor.
- Propamokarb kromě kurativního působení redukuje růst mycelia.

Divexo® v bramborách

Účinná látka Ametoktradin 120 g/l (Initium®), Propamokarb -hydrochlorid 451 g/l

Formulace Suspenzní koncentrát (SC)

Choroba **Plíseň bramborová**

Aplikační dávka **2,0 l/ha**

Dávka vody **200–400 l/ha**

Termín aplikace **Od 21 BBCH do 89 BBCH**

Poznámky k aplikaci Maximální počet aplikací: 2x za rok
Ochranná lhůta: 7 dní
Interval mezi aplikacemi: 5–10 dní

Přípravek je dále registrován do cibule a česneku.


Aplikace proti plísni v bramborách

Enervin® Pro - doporučeno pro začátek vegetace

Divexo® - pro spolehlivou účinnost během vegetace

Enervin® Pro

Divexo®




Sercadis®

Tak flexibilní, jak potřebujete

Nové fungicidní mořidlo do brambor

Novinka 2025



- Nová účinná látka v ochraně brambor
- Velmi dobrá selektivita
- Aplikace možná všemi nejpoužívanějšími způsoby
- Bez významných omezení - lze použít v OP II
- Registrace proti všem významným chorobám

Porovnání účinných látek dle registrace proti jednotlivým chorobám

Informace na etiketě	Kořenomorka bramborová	Stříbřitost slupky bramboru	Koletotrichové vadnutí brambor
Sercadis®	✓	✓	✓
Azoxystrobin	✓		✓
Flutolanil	✓		



Kořenomorka bramborová
(*Rhizoctonia solani*)






Stříbřitost slupky bramboru
(*Helminthosporium solani*)




**Černá tečkovitost bramboru
(koletotrichové vadnutí brambor)**
(*Colletotrichum coccodes*)

Sercadis® - aplikace umožňující různé technologie




Výborná účinnost na kořenomorku

Aplikace při výsadbě, pokusy CZ, UK, DE, FR, NL, TR, PT, LV, PL; 2011–2023, n=24



Přínos v bramborách

Aplikace při výsadbě, pokusy CZ, NL, DE, FR, UK, PL, DK, FI, LV, NL; 2011–2024, n=53



Sercadis® v bramborách

Účinná látka	Fluxopyroxad 300 g/l (Xemium®)
Formulace	Suspenzní koncentrát (SC)
Choroba	Kořenomorka bramborová Stříbřitost slupky bramboru Koletotrichové vadnutí brambor
Aplikační dávka	0,6 l/ha - aplikace na hlízy (1,2 l/ha brázdy) 0,8 l/ha - aplikace na půdu (1,6 l/ha brázdy) 0,2 l/1 000 kg hlíz - moření před výsadbou
Přípravek je dále registrovaný do jaderovin, peckovin a révy.	



Belanty®

Rozdíl, který oceníte




- Nový specialista proti alternáriové skvrnitosti
- Rychlý příjem listy a dlouhodobé působení
- Flexibilní použití, odolnost proti smyvu

Belanty® obsahuje účinnou látku Revysol®. Azol Revysol® - splňuje nejprísnejší kritéria nejen z hlediska účinnosti, ale také z pohledu toxikologického, s ohledem na životní prostředí a bezpečnost pro člověka. Revysol® je mimořádně flexibilní, rychle proniká do pletiv a dlouhodobě chrání rostlinná pletiva. Fungicid Belanty® vykazuje na alternáriovou skvrnitost vysokou účinnost. Zajišťuje tak navýšení výnosu a celkové vylepšení ekonomiky pěstování. V mnoha pokusech se ukázalo, že Belanty® s obsahem Revysolu® dosahuje vyšší účinnosti než konkurenční přípravky.

Hodnocení účinnosti v %

Pokusy EU, odrůda Kuras



Napadení neošetřené kontroly bylo 97,5 %.
U Belanty® byla zjištěna vynikající účinnost proti alternáriové skvrnitosti. Zároveň byl zjištěn vysoký výnos - aplikace Belanty® se vyplatí.

Více informací naleznete na etiketě a u obchodního zástupce BASF.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Tento materiál má pouze informativní charakter.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Belanty® v bramborách

Účinná látka	Mefentriflukonazol 75 g/l (Revysol®)
Formulace	Suspenzní koncentrát (SC)
Choroba	Alternáriová skvrnitost
Aplikační dávka	1,25 l/ha
Dávka vody	100–400 l/ha
Termín aplikace	Od 21 BBCH do 93 BBCH
Poznámky k aplikaci	Maximální počet aplikací: 3x za rok Ochranná lhůta: 3 dny Interval mezi aplikacemi: 7 dnů (7–14 dní v závislosti na síle infekčního tlaku)
Doporučení	Aplikace sólo nebo v kombinaci s ostatními fungicidy proti plísni bramborové

Přípravek je dále registrovaný do cukrové řepy, kukurice, řepky olejky, jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, meruňky a révy.

BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz

BASF
We create chemistry