



Formulace přípravku Medax® Max je navržena k aplikaci přímo do přimíchávací nádrže postřikovače. Nerozpouštějte přípravek Medax® Max s vodou zvlášť v kbelíku před nasypáním do přimíchávacího zařízení. Zabraňte namočení přípravku vodou.

Tank-mix: správný postup

- 1** Naplňte přibližně ½ nádrže postřikovače vodou



- 2** Spusťte přimíchávací zařízení ve střední až vysoké intenzitě, aby se Medax® Max rychle rozpustil. Ujistěte se, že voda protéká v přimíchávací nádobě i po jejích stěnách před přidáním přípravku. Je doporučeno dodržovat dostatečný průtok vody, aby byl přípravek rozpuštěn a odstraněn z přimíchávacího zařízení.



- 3** Postupně nasypete Medax® Max přímo do proudu vody, přitom přizpůsobte rychlost vsypávání rychlosti rozpouštění. **Doporučujeme pomalé nasypání kruživým pohybem! Nesypete přípravek příliš dlouho jen na jedno místo. Zabezpečíte si tím plynulé rozpouštění v proudu vody a vyhnete se lokálnímu ucpání.**

Přidávejte přípravky v pořadí: 1. přípravek proti pění, je-li to nutné; 2. hnojivo, stopové soli (pevné); 3. pevné formulace; 4. kapalné formulace; 5. rozpouštědla, emulze, koncentráty

Nesypte Medax® Max přímo do přimíchávací nádrže bez dostatečného průtoku vody a promíchávání v nádrži.



pevné či kapalné hnojivo

pevná formulace


WG / WP
SG / SP

kapalná formulace

SC / CS / SL / SE / EW
EO / EC / OD / DC / ME

- 4** Doplňte vodu do postřikovače, přidejte smáčedla (dle formulace)


- 5** Vypláchněte obal



- 6** Pevně uzavřete obal



- 7** Kontinuálně promíchejte nádrž. Když je Medax® Max přidán do zásobníku postřikovače, měl by být rutinně promíchán a co nejdříve aplikován.



Medax® Max

Maximální flexibilita

BASF

We create chemistry