

Biocidní přípravek

STORM[®] Secure

RB – nástraha k přímému použití: blok

PT – 14 Rodenticidy (Přípravky pro regulaci živočišných škůdců)

Vysoce účinná požerová nástraha ve formě voskových bloků k hubení škodlivých hlodavců (myš domácí, potkan, krysa).

Pouze pro odborně způsobilou osobu nebo profesionální uživatele.

Účinná látka:

flokumafen 50 mg/kg (cca 0,005 % hmot.)

Neúčinná látka: ortho-phenylphenol (0,05 % hmot.)

Název nebezpečných látek: flokumafen (ISO); reakční směs cis-4-hydroxy-3-[3-(4-{4-(trifluormethyl)benzyl}oxy)fenyl]-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a trans-4-hydroxy-3-[3-(4-{4-(trifluormethyl)benzyl}oxy)fenyl]-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on

Číslo povolení: CZ-0003894-0000



NEBEZPEČÍ

H360D MŮŽE POŠKODIT PLOD V TĚLE MATKY.

H373 MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ORGÁNŮ (KREV) PŘI PRODLOUŽENÉ NEBO OPAKOVANÉ EXPOZICI.

P101 JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU.

P102 UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

P103 PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI.

P201 PŘED POUŽITÍM SI OBSTAREJTE SPECIÁLNÍ INSTRUKCE.

P202 NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD JSTE SI NEPŘEČETLI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NEPOROZUMĚLI JIM.

P260 NEVDECHUJTE PRACH.

P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE.

P308 + P313 PŘI EXPOZICI NEBO PODEZŘENÍ NA NI: VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

P314 NECÍTÍTE-LI SE DOBŘE, VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC / OŠETŘENÍ.

P405: SKLADUJTE UZAMČENÉ.

P501: ODSTRAŇTE OBSAH / OBAL PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

OBSAHUJE JEDOVATÝ ANTIKOAGULANT FLOKUMAFEN.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÉ POKYNY.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Držitel povolení:	BASF spol. s r.o., Radlická 354/107b, 158 00 Praha 5, ČR
Výrobce:	BASF Agro B. V. Amhem (NL) Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švýcarsko
Právní zástupce v ČR:	BASF spol. s r.o., Radlická 354/107b, 158 00 Praha 5, ČR tel. + 420 235 000 111
Velikosti balení a obalový materiál:	Volné nástrahové bloky (á 20 g) nebo PE/PP/PET/HDP laminované sáčky obsahující 20 - 60 g nástrahy, dále balené do: Plastová nádoba (kbelík, láhev, kelímek nebo podobné): 3 kg – 10 kg, PP, HDPE, PET, PE, nebo LDPE; uzávěr: víko z PP, HDPE, PET, PE, nebo LDPE Uzavíratelný pytel: 3 kg – 10 kg, papírový laminát (PE, PP, PET, nebo HDPE) Uzavíratelná krabice: 3 kg – 10 kg, karton s LDPE vložkou
Datum výroby:	uvedeno na obalu
Číslo šarže:	uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	3 roky od data výroby. Neskladujte přípravek při teplotách nad 30 °C.

● **Použití č. 1:**

myš domácí a krysa či potkan – odborně způsobilé osoby – v interiéru

Cílové organismy včetně vývojových stádií

Myš domácí (*Mus musculus*) – mláďata, dospělci
Potkan obecný (*Rattus norvegicus*) – mláďata a dospělci
Krysa obecná (*Rattus rattus*) – mláďata a dospělci

Oblast použití: v interiéru

Způsob aplikace:

Aplikace nástrah – pulzní aplikace

Formy nástrahy:

- Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření
- Zakrytá a chráněná nástražná místa (pokud poskytují stejnou úroveň ochrany pro necílové organismy a lidi jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření).

Aplikační dávky a četnost aplikací:

Myš domácí: 1 blok (20 g) na jednu staničku

Krasy a potkani: 2-3 bloky (40–60 g) na jednu staničku

Neředí se.

Nástraha připravená k použití

Pulzní aplikační technika:

Spotřebovanou nástrahu vyměňte po 3 dnech a poté maximálně v 7denních intervalech. Netknutou nástrahu přemístěte do oblastí aktivního výskytu. Při každé kontrole doplňte spotřebovanou nástrahu. Nástrahu umístěte do infikované oblasti v odolných staničkách nebo do chráněných a nepřístupných míst. Pokud nedochází k omezení výskytu škůdce, zjistěte důvody a zvažte jiné rozmístění nástrah nebo zvýšení počtu nástražných bodů.

Kategorie uživatelů – odborně způsobilá osoba

Návod k danému způsobu použití:

Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku.

Dodržujte veškeré další pokyny stanovené v příslušném kodexu osvědčených postupů.

Dodatečné instrukce pro pulzní nástrahu:

Spotřebovanou nástrahu vyměňte po 3 dnech a poté maximálně v 7denních intervalech. Odstraňujte nástrahu, která se dostala mimo určená místa, odstraňujte těla uhynulých hlodavců.

Postupujte podle specifických pokynů uvedených v platném kodexu osvědčených postupů na národní úrovni.

Frekvence návštěv ošetřené oblasti je na uvážení ošetřující osoby na základě průzkumu provedeného na začátku ošetření. Frekvence by měla být v souladu s metodickým pokynem pro provádění ochranné deratizace.

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o deratizaci hlodavců v souladu s příslušným kodexem osvědčených postupů.

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Aby se snížilo riziko sekundární otravy, provádějte v průběhu deratizace v častých intervalech vyhledávání a odstraňování uhynulých hlodavců v souladu s doporučeními stanovenými v metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace.

Nepoužívejte přípravek jako trvalou nástrahu k prevenci zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců.

Mezi jednotlivými aplikacemi neumývejte vodou deratizační staničky ani náčiní použité v zakrytých a chráněných místech s nástrahou.

Nepoužívejte v místech, kde existuje podezření na rezistenci vůči účinné látce.

Nepoužívejte střídavě různé antikoagulanty se srovnatelnou nebo slabší účinností, aby se nevytvořila rezistence.

Při prostřídávání přípravků použijte rodenticidy, které nejsou antikoagulační, nebo silnější antikoagulant.

Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití:

Při umísťování deratizačních stanic v blízkosti drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou.

Dále viz kapitola Obecná pravidla použití.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

viz kapitola Obecná pravidla použití

Podmínky skladování a doba trvanlivost přípravku při běžných podmínkách skladování:

viz kapitola Obecná pravidla použití

● **Použití č. 2:**

myš a/nebo krysa a potkan – odborně způsobilé osoby – v exteriéru kolem budov

Cílové organismy včetně vývojových stádií

Myš domácí (*Mus musculus*) – mláďata, dospělci

Potkan obecný (*Rattus norvegicus*) – mláďata a dospělci

Krysa obecná (*Rattus rattus*) – mláďata a dospělci

Oblast použití: v exteriéru kolem budov

Způsob aplikace:

Aplikace nástrah – pulzní aplikace

Formy nástrahy:

- Nástraha k přímému použití v deratizačních stanicích odolných proti násilnému otevření.
- Zakrytá a chráněná nástražná místa (pokud poskytují stejnou úroveň ochrany pro necílové organismy a lidi jako deratizační stanice).
- Přímá aplikace nástrahy k přímému použití do nory.

Aplikační dávky a četnost aplikací:

Myš domácí: 1 blok (20 g) na jednu stanicu

Krysy a potkani: 2-3 bloky (40–60 g) na jednu stanicu nebo noru

Neředí se.

Pulzní aplikační technika:

Spotřebovanou nástrahu vyměňte po 3 dnech a poté maximálně v 7denních intervalech. Netknutou nástrahu přemístěte do oblastí aktivního výskytu. Při každé kontrole doplňte spotřebovanou nástrahu. Nástrahu umísťte do infikované oblasti v odolných stanicích nebo do chráněných a nepřístupných míst. Pokud nedochází k omezení výskytu škůdce, zjistěte důvody a zvažte jiné rozmístění nástrah nebo zvýšení počtu nástražných bodů.

Kategorie uživatelů – odborně způsobilá osoba

Návod k danému způsobu použití:

Chraňte nástrahu před vlivem povětrnostních podmínek. Nástrahu pokládejte v prostorách, kde nehrozí záplavy.

Vyměňte nástrahu na místech, kde byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku.

Při venkovním použití musí být nástražná místa zakryta a umístěna na strategických místech, aby se minimalizovala expozice necílových druhů.

Nástrahy musí být umístěny tak, aby se minimalizovala expozice necílových druhů a dětí.

Zakryjte nebo zablokujte vchody do nor, ve kterých byla umístěna nástraha. Snížíte tak riziko, že nástraha nebude akceptována nebo se z nory vysype.

Postupujte podle specifických pokynů uvedených v platném kodexu osvědčených postupů na národní úrovni.

Frekvence návštěv ošetřené oblasti je na uvážení ošetřující osoby na základě průzkumu provedeného na začátku ošetření. Frekvence by měla být v souladu s metodickým pokynem pro provádění ochranné deratizace.

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití:

Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o deratizaci hlodavců v souladu s příslušným kodexem osvědčených postupů.

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Aby se snížilo riziko sekundární otravy, provádějte v průběhu deratizace v častých intervalech vyhledávání a odstraňování uhynulých hlodavců v souladu s doporučeními stanovenými v metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace.

Nepoužívejte přípravek jako trvalou nástrahu k prevenci zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců.

Mezi jednotlivými aplikacemi neumývejte vodou deratizační staničky ani náčiní použité v zakrytých a chráněných místech s nástrahou.

Nepoužívejte v místech, kde existuje podezření na rezistenci vůči účinné látce.

Nepoužívejte střídavě různé antikoagulanty se srovnatelnou nebo slabší účinností, aby se nevytvořila rezistence.

Při prostřídávání přípravků použijte rodenticidy, které nejsou antikoagulační, nebo silnější antikoagulant.

Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití:

Při umísťování nástrah v blízkosti povrchových vod (např. řeky, rybníky, vodní kanály, hráze, zavlažovací příkopy) nebo drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou.

Dále viz kapitola Obecná pravidla použití.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

viz kapitola Obecná pravidla použití

Podmínky skladování a doba trvanlivost přípravku při běžných podmínkách skladování:

viz kapitola Obecná pravidla použití

● **Použití č. 3:**

potkan – odborně způsobilé osoby – kanalizace

Cílové organismy včetně vývojových stádií

Potkan obecný (*Rattus norvegicus*) – mláďata a dospělci

Oblast použití: kanalizace

Způsob aplikace:

Aplikace nástrah

Formy nástrahy:

- Nástraha k přímému použití, která se ukotví nebo aplikuje v deratizačních staničkách, čímž se zabrání kontaktu nástrahy s odpadní vodou.
- Zakrytá a chráněná nástražná místa.

Aplikační dávky a četnost aplikací:

100 g nástražných bloků na nástražný bod (kanalizační otvor / vstup)

Neředí se.

Kategorie uživatelů – odborně způsobilá osoba

Návod k danému způsobu použití:

Vytvořte nástrahové body v kanalizačním systému, například v místě kanalizačních otvorů/vstupů. Zajistěte nástrahu, např. drátem tak, aby nemohla být přemístěna nebo odplavena.

Pravidelně nástrahu kontrolujte a v případě potřeby doplňujte.

Nástrahy musí být aplikovány tak, aby se nedostaly do kontaktu s vodou a nebyly vyplaveny.

Dodržujte veškeré další pokyny stanovené v příslušném kodexu osvědčených postupů.

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití:

Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou pulzní aplikace nástrahy.

Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití:

viz kapitola Obecná pravidla použití

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

viz kapitola Obecná pravidla použití

Podmínky skladování a doba trvanlivost přípravku při běžných podmínkách skladování:

viz kapitola Obecná pravidla použití

● **Použití č. 4:**

myš domácí – profesionální uživatelé – v interiéru

Cílové organismy včetně vývojových stádií

Myš domácí (*Mus musculus*) – mláďata, dospělci

Oblast použití: v interiéru

Způsob aplikace:

Aplikace nástrah

Formy nástrahy:

- Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření

Aplikační dávky a četnost aplikací:

Umístěte nástrahu po celé oblasti s výskytem hlodavce v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

1 blok (20 g nástrahy) na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny 1-2 metry.

Neředí se.

Nástraha připravená k použití.

Kategorie uživatelů – profesionální uživatelé

Návod k danému způsobu použití:

Deratizační staničky by měly být kontrolovány alespoň každé 2 až 3 dny po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Dodržujte veškeré další pokyny stanovené v příslušném kodexu osvědčených postupů.

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku nebo staničky.

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

viz kapitola Obecná pravidla použití

Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití:

Při umísťování deratizačních staniček v blízkosti drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou.

Dále viz kapitola Obecná pravidla použití.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

viz kapitola Obecná pravidla použití

Podmínky skladování a doba trvanlivost přípravku při běžných podmínkách skladování:

viz kapitola Obecná pravidla použití

● **Použití č. 5:**

Krysa a potkan – profesionální uživatelé – v interiéru

Cílové organismy včetně vývojových stádií

Potkan obecný (*Rattus norvegicus*) – mláďata a dospělci

Krysa obecná (*Rattus rattus*) – mláďata a dospělci

Oblast použití: v interiéru

Způsob aplikace:

Aplikace nástrah

Formy nástrahy:

- Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření

Aplikační dávky a četnost aplikací:

Umístěte nástrahu po celé oblasti s výskytem hlodavce v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2-3 bloky (40–60 g) na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny 5-10 metrů.

Neředí se.

Kategorie uživatelů – profesionální uživatelé

Návod k danému způsobu použití:

Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Dodržujte veškeré další pokyny stanovené v příslušném kodexu osvědčených postupů.

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření. Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace.

Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky.

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

viz kapitola Obecná pravidla použití

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy:

Při umísťování deratizačních staniček v blízkosti drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou.

Dále viz kapitola Obecná pravidla použití.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

viz kapitola Obecná pravidla použití

Podmínky skladování a doba trvanlivost přípravku při běžných podmínkách skladování:

viz kapitola Obecná pravidla použití

● **Použití č. 6:**

Myš a/nebo krysa a potkan – profesionální uživatelé – v exteriéru kolem budov

Cílové organismy včetně vývojových stádií

Myš domácí (*Mus musculus*) – mláďata, dospělci

Potkan obecný (*Rattus norvegicus*) – mláďata a dospělci

Krysa obecná (*Rattus rattus*) – mláďata a dospělci

Oblast použití: v exteriéru kolem budov

Způsob aplikace:

Aplikace nástrah

Formy nástrahy:

- Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření

Aplikační dávky a četnost aplikací:

Umístěte nástrahu po celé oblasti s výskytem hlodavce v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Myš domácí: 1 blok (20 g nástrahy) na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny 1-2 metry.

Krysy a potkani: 2-3 bloky (40–60 g) na jednu staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny 5-10 metrů.

Kategorie uživatelů – profesionální uživatelé

Návod k danému způsobu použití:

Chraňte nástrahu před povětrnostními podmínkami (např. deštěm, sněhem atd.). Umístěte deratizační staničky v prostorech, kde nehrozí záplavy.

Deratizační staničky je nutno kontrolovat [u myši – nejméně každé 2 až 3 dny] [u krys a potkanů – nejdříve 5 až 7 dnů po] zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Dodržujte veškeré další pokyny stanovené v příslušném kodexu osvědčených postupů.

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky.

Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Neaplikujte tento přípravek přímo do nor.

Mezi jednotlivými aplikacemi neumývejte deratizační staničky vodou.

Aby se snížilo riziko sekundární otravy, v průběhu deratizace v častých intervalech (např. nejméně dvakrát týdně) vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce.

Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů. Informace o přípravku (tj. štítek a/nebo příbalová informace) musí jasně doporučovat, aby si uživatel v případě, že má na konci deratizace podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud je stále pozorována aktivita hlodavců), vyžádal radu dodavatele přípravku nebo se obrátil na deratizační službu.

Nepoužívejte nástrahy obsahující antikoagulační účinné látky jako trvalé nástrahy k prevenci zamoření hlodavci nebo ke sledování činnosti hlodavců.

Přípravek nesmí být dodáván široké veřejnosti.

Přípravek je určen k použití pouze v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Uživatelé musí deratizační staničky řádně označit informacemi uvedenými v oddíle „Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí“. Označujte deratizační staničky podle doporučení přípravku.

Nástrahy musí být bezpečně umístěny tak, aby se minimalizovalo riziko konzumace jinými zvířaty nebo dětmi. Nástrahu je třeba zajistit tak, aby ji nebylo možné z deratizační staničky odtáhnout.

viz kapitola Obecná pravidla použití

Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití:

Při umísťování nástrah v blízkosti povrchových vod (např. řeky, rybníky, vodní kanály, hráze, zavlažovací příkopy) nebo drenážních systémů zajistěte, aby se nástraha nedostala do styku s vodou.

Dále viz kapitola Obecná pravidla použití.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

viz kapitola Obecná pravidla použití

Podmínky skladování a doba trvanlivost přípravku při běžných podmínkách skladování:

viz kapitola Obecná pravidla použití

Obecná pravidla pro použití

Návod pro použití:

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.

Před položením nástrahy proveďte průzkum zamořené oblasti a posouzení na místě a určete druh hlodavců, místa jejich aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu a rozsah zamoření.

Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo zbytky potravin).

Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy.

Přípravek by měl být používán pouze jako součást systému integrované ochrany proti škůdcům (IPM), který zahrnuje například hygienická opatření, a pokud je to možné, i fyzikální metody regulace.

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Přípravek by měl být umístěn v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.).

Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím.

Deratizační staničky musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemisťovány ani otevírány.

Je-li přípravek používán ve veřejných prostorách, měly by být ošetřené plochy po dobu deratizace označeny a poblíž nástrah musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem, společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy.

Nástrahu je třeba zajistit tak, aby ji nebylo možné z deratizační staničky odtáhnout.

Umístěte přípravek mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.

Neumísťujte přípravek v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu.

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám.

Při používání přípravku nejezte, nepijte, nekuřte.

Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku.

Pokud je požer nástrahy vzhledem ke zjevnému rozsahu zamoření nízký, zvažte přenesení deratizačních staniček na jiné místo a možnost přechodu na jinou formu nástrahy.

Pokud po 35 dnech deratizace dochází i nadále k požírání nástrah a nezaznamenáte žádný pokles aktivity hlodavců, je nutné stanovit pravděpodobnou příčinu.

Po vyloučení jiných možností je pravděpodobné, že hlodavci jsou rezistentní, zvažte tedy použití jiného antikoagulačního rodenticidu.

Zvažte rovněž alternativní regulaci hlodavců pomocí pastí.

Opatření ke zmírnění rizika:

Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o deratizaci hlodavců.

Aby se snížilo riziko sekundární otravy, provádějte v průběhu deratizace v častých intervalech vyhledávání a odstraňování uhynulých hlodavců v souladu s doporučeními stanovenými v metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace.

Přípravky se nesmí používat déle než 35 dnů bez vyhodnocení stavu zamoření a účinnosti deratizace.

Nepoužívejte nástrahy obsahující antikoagulační účinné látky jako stálé nástrahy za účelem prevence zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců.

Uhynulé hlodavce odstraňujte v souladu s místními požadavky.

Nástrahy musí být bezpečně umístěny tak, aby se minimalizovalo riziko konzumace jinými zvířaty nebo dětmi. Nástrahu je třeba zajistit tak, aby ji nebylo možné z deratizační staničky odtáhnout.

Určeno k použití pouze v deratizačních staničkách přiměřeně odolných proti násilnému otevření.

Uživatelé musí deratizační staničky řádně označit informacemi uvedenými v oddíle „Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí“. Označujte deratizační staničky v souladu s doporučeními uvedenými u přípravku.

Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů.

V případě, že máte na konci deratizace podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozorujete aktivitu hlodavců), vyžádejte si radu dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu.

Mezi jednotlivými použitími neomývejte deratizační staničky vodou.

Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí:

Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku.

Při jeho požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi ně může patřit krvácení z nosu a z dásní.

V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev.

Antidotum: Vitamín K1 podávaný pouze zdravotnickými / veterinárními pracovníky.

V případě:

kontakt s kůží omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem.

zasažení očí vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udrzte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut.

při orální expozici vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení.

při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal nebo etiketu přípravku. V případě požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

Deratizační staničky musí být označeny těmito informacemi: „nepřemísťujte a neotvírejte“; „obsahuje přípravek na hubení hlodavců“; „název přípravku nebo číslo povolení“; účinná látka (účinné látky)“ a „v případě nehody zavolejte toxikologické středisko“.

Nebezpečný pro volně žijící zvířata.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
Tel: 224 919 293 a 224 915 402

Další informace:

Vzhledem k jejich opožděnému působení jsou antikoagulační rodenticidy účinné 4 až 10 dnů po požití nástrahy.

Hlodavci mohou přenášet onemocnění.

Nedotýkejte se uhynulých hlodavců holýma rukama, při jejich likvidaci používejte rukavice nebo nástroje, jako jsou například kleště.

Tento přípravek obsahuje hořkou látku a barvivo.

Bezpečnostní opatření a osobní ochranné pracovní prostředky:

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):

Ochrana dýchacích orgánů

Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Částicový filtr EN 143 typ P3, vysokoúčinný (pevné a kapalné částice toxických a velmi toxických látek).

Ochrana rukou

Ochranné rukavice (EN ISO 374-1) jsou nezbytné pro bezpečné zacházení s tímto produktem a také nutné z důvodu ochrany před vrozenými chorobami hlodavců. např. nitrilový kaučuk (0,4 mm), chloroprenový kaučuk (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a další.

Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

Ochrana těla

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.

Nástroje použité k aplikaci přípravku STORM® Secure omyjte vodou přímo na místě aplikace, přičemž oplachové vody nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod a recipienty povrchových vod.



Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu:

Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Na konci deratizace zlikvidujte nespotřebovanou nástrahu i obal jako nebezpečný odpad. Obal přípravku znovu nepoužívejte k žádnému jinému účelu.

Po ukončení deratizace je nutno posbírat a zneškodnit zbytky nástrahy, aby se zabránilo nahodilému sebrání nástrahy dětmi, domácími mazlíčky nebo necílovými živočichy. Tyto nástrahy jsou považovány za toxický odpad a musí být soustředěné ve speciální skladovací místnosti, odstraněny a zničeny. Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. Obaly dejte buď do sběru k recyklaci, nebo k likvidaci ke spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200–1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím smíchání s hořlavým materiálem (pilinami apod.).

Uhynulá těla hlodavců kontaminovaná přípravkem je nutné sbírat, shromažďovat a odstranit jejich spálením ve spalovně nebezpečných odpadů.

Podmínky skladování a doba trvanlivost přípravku při běžných podmínkách skladování:

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých, chladných, dobře větraných, uzamykatelných skladech při teplotách nepřesahujících 30 °C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.

Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků a domácích a hospodářských zvířat.

Ke skladování nelze použít místnosti, v nichž byly skladovány pesticidy. Jejich pach by mohl hlodavce odpuzovat.

Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou biologickou účinnost po dobu 3 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.

Kodexem osvědčených postupů se miní metodické pokyny pro provádění ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. Metodický pokyn pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

® registrovaná známka BASF

UFI: 8CC0-Y0VG-U00H-4W9G