



■ - BASF

We create chemistry

Seclira® Fly Bait.

Přípravek pro přímé použití
k rychlému a efektivnímu
hubení much

Obtížná likvidace much

Eliminace much v komerčním a domácím prostředí může být velmi náročné. Mouchy intenzivně létají jak zvenčí, nebo se množí uvnitř, zejména v citlivých prostorách, jako jsou

kuchyně a bary. Dobrá hygiena v obou oblastech je nezbytná pro udržení kontroly populace much.



Seclira® Fly Bait


Je první přímo použitelný přípravek, který obsahuje atraktant určený k lákání much na ošetřená místa se současným obsahem účinné látky.

Udělejte ošetření proti mouchám, neviditelné pro zákazníky pomocí Seclira® Fly Bait:

- Jednoduchá a přesná aplikace
- Bez barvy a bez zápachu
- Rychlá aplikace
- Rychlé působení a dlouhotrvající účinek

Mouchy padají k zemi během několika sekund nebo minut po kontaktu nebo požití. V téměř reálném komorovém testu padlo na zem více než 90 % všech much do 2 hodin a uhynuly během jednoho dne.

Knock down efekt a úmrtnost much domácích 42 dní po aplikaci na povrch.



— Seclira® Fly Bait — Imidacloprid Bait
— Thiametoxam Bait — Clothianidin Bait



Účinná látka
Dinotefuran 0,5%



Použití
Uvnitř v komerčních, průmyslových a domácích prostorách, v prostorách pro manipulaci s potravinami, ve veřejných budovách



Kategorie uživatelů
Profesionální uživatel



Cílový druh
Moucha



Dávkování

- Metoda: postřik
- Aplikujte 16 g produktu/m² – ekvivalent aplikace lineárním směrem po dobu 3 sekund

- Nepřekračujte 20 m² ošetřeného povrchu na 100 m² velikosti budovy
- Nepřekračujte 11 aplikací za rok
- Vstupujte do prostoru znovu až po zaschnutí produktu



Kam aplikovat ?



Rámy dveří



Kolem oken



Pod a za barem,
sudy



V blízkosti
světél



Pergoly



Nádoby
na odpad,
popelnice



Odpadkové
koše



Vyměnitelné
nástrahové
desky



Hasící
zařízení

Jak aplikovat?

Aplikaci v bodech nebo v pásech můžete přizpůsobit místním podmínkám

Nástřik na neporézní povrch

30 cm od povrchu,
stříkejte 3 sekundy
na délku 1 m



➔ Možnost aplikace v restauračních prostorách, je třeba zajistit, aby povrchy, kde jsou potraviny skladovány, připravovány nebo konzumovány, nebyly v přímém kontaktu s ošetřenými povrchy.

➔ Při kontrole je klíčové určit oblasti, kde se mouchy krmí a odpočívají, a podle toho aplikovat. Mouchy zanechávají na povrchích skvrny (trus), tato místa by měla být ošetřena.

Profesionální hubení škůdců se **Seclira® Fly Bait**

Prvním krokem v jakémkoli programu eliminace much a mušek je důkladná kontrola a posílení hygienických opatření (pokud je to vhodné). Následně je třeba řešit likvidaci much.

Seclira® Fly Bait se dokonale hodí pro domácí i komerční použití a poskytuje výjimečnou

kontrolu nad obtížnými druhy much a mušek, pokud je správně aplikována. Pravidelné sledování na každém povrchu vám poskytne informaci o tom, jak populace much reaguje na celkový management obtěžujících much a mušek.

- Jednoduchá a přesná aplikace
- Bez barvy a bez zápachu
- Rychlá aplikace
- Rychlé působení a dlouhotrvající účinek



Pro více informací navštivte
naše webové stránky:
www.agro.basf.cz

BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, Czech Republic

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Seclira® obsahuje dinotefuran. Seclira® je registrovaná ochranná známka společnosti BASF. © 2022 Copyright BASF. Všechna práva vyhrazena.